

Para adultos con
NARCOLEPSIA...

Despierte
CON
WAKIX

Wakix[®]
pitolisant tablets



Chris

Vive con narcolepsia
Toma WAKIX desde 2021

**Aprobado por la FDA para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE)
o la cataplejía en adultos con narcolepsia**

Información importante de seguridad

No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier componente de WAKIX, o si tiene enfermedad hepática grave.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 15 y 16 y la [Información de prescripción completa](#) adjunta.


La narcolepsia no debería impedirle vivir su vida

Vivir con narcolepsia es difícil y encontrar formas de controlar la somnolencia diurna excesiva (SDE) o la cataplejía puede ser un desafío.

No está solo.


Vivir con narcolepsia

Los dos síntomas más frecuentes de la narcolepsia son somnolencia diurna excesiva (SDE) y cataplejía



Todas las personas

con narcolepsia tienen una **somnolencia diurna excesiva**, la incapacidad de mantenerse despierto y alerta durante el día o la sensación persistente de cansancio.



Casi

2 de cada 3

personas con narcolepsia también pueden tener **cataplejía**, la aparición repentina de músculos débiles o paralizados, generalmente provocados por fuertes emociones o determinadas situaciones.



Aproximadamente

165,000

personas en los Estados Unidos viven con narcolepsia.

¿Cómo puede sentirse la SDE?

Las personas que viven con narcolepsia pueden experimentar su **somnolencia diurna excesiva (SDE)** de diferentes maneras, como:



Luchar por mantenerse despiertas

Las personas pueden luchar por mantenerse despiertas durante el día o quedarse dormidas sin previo aviso.



Sentirse somnolientas poco después de despertarse

Algunas personas pueden despertarse sintiéndose algo renovadas, pero con sueño de nuevo en unas horas.



Sentirse somnolientas en situaciones de menor actividad

Las personas pueden sentirse somnolientas en situaciones que no requieren participación activa, como ver la televisión o ir en auto.



Hable con su proveedor de atención médica sobre su SDE y sobre cómo le puede estar afectando.

¿Cómo puede sentirse la cataplejía?

Las personas con narcolepsia que tienen **cataplejía** pueden experimentarla de diferentes maneras. La cataplejía puede hacer que las personas con narcolepsia se desmayen por completo, pero con más frecuencia se produce en áreas específicas del cuerpo, como:



Deformación de rodillas



Debilidad de las manos
(caída de objetos)



Mandíbula colgante

Las personas pueden experimentar cataplejía de diferentes maneras, como:

- Debilidad o pesadez muscular
- “Episodios” de debilidad muscular
- Habla arrastrada
- Caída de la cabeza, de la cara o de los párpados
- Estar boquiabierto
- Pérdida del control muscular
- Torpeza
- Pérdida de agarre o caída de objetos



No siempre es obvio para las personas que estas experiencias de cataplejía estén relacionadas con la narcolepsia.

Hable con su proveedor de atención médica si ha experimentado alguno de estos signos de cataplejía y cómo le puede estar afectando.

Wakix[®]
pitolisant tablets

Despierte
CON
WAKIX

Chris

Hermano, amigo, profesional de la salud mental, vive con narcolepsia. Toma WAKIX desde 2021.

Ya sea que tenga un diagnóstico reciente de narcolepsia o que se le haya diagnosticado durante años y esté listo para un cambio, **hable con su proveedor de atención médica sobre cómo WAKIX** podría ayudar a controlar su somnolencia diurna excesiva (SDE) o cataplejía.

Indicaciones y uso

WAKIX es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE) o la aparición repentina de músculos débiles o paralizados (cataplejía) en adultos con narcolepsia.

Información importante de seguridad

No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier componente de WAKIX, o si tiene enfermedad hepática grave.



[Escuche la historia de Chris y otras historias personales de cómo WAKIX ha ayudado](#)



Aprobado por la FDA para tratar:



**Somnolencia diurna
excesiva (SDE)**



Cataplejía

**WAKIX se puede tomar para tratar la SDE, cataplejía
o ambas en adultos con narcolepsia.**

¿Por qué WAKIX® (pitolisant)?



El primero de su clase

WAKIX es el **primer medicamento de su clase** que aumenta los niveles de **histamina** en el cerebro.



Medicamento en tabletas una vez al día

WAKIX es el primer y único **medicamento en tabletas que se toma una vez al día** y que está **aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)** para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE) o cataplejía en adultos con narcolepsia.



No es una sustancia controlada

WAKIX es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para personas con narcolepsia que **no es una sustancia controlada**.

- En un estudio clínico, WAKIX no mostró potencial de abuso, similar al placebo (píldora de azúcar).



No es un estimulante

WAKIX **no es un estimulante**, por lo que la forma en que se siente su cuerpo al tomar WAKIX puede ser diferente de los medicamentos que ha tomado en el pasado.

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus condiciones médicas, incluido si tiene irregularidades en el ritmo cardíaco, si nació con una condición cardíaca o si los niveles de electrolitos en la sangre son demasiado altos o demasiado bajos. WAKIX tiene un efecto sobre la actividad eléctrica del corazón conocida como prolongación del intervalo QT. Los medicamentos con este efecto pueden provocar alteraciones en el ritmo cardíaco, que son más probables en pacientes con factores de riesgo como determinadas afecciones cardíacas, o cuando se toman en combinación con otros medicamentos que afectan al QT. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los demás medicamentos que tome.

El riesgo de prolongación del intervalo QT puede ser mayor en pacientes con enfermedad hepática o renal. WAKIX no está recomendado en pacientes con enfermedad renal terminal.


Wakix[®]
pitolisant tablets

¿Cómo funciona WAKIX® (pitolisant)?

WAKIX es el primer medicamento de su clase que se cree que funciona de manera diferente

Aunque la forma en que **WAKIX** funciona no se comprende por completo, se cree que WAKIX reduce la **somnolencia diurna excesiva (SDE)** o la **cataplejía** aumentando la histamina en el cerebro.

WAKIX aumenta los niveles de histamina en el cerebro



Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta.

Algunos medicamentos pueden aumentar la cantidad de WAKIX que entra en la sangre y algunos medicamentos pueden disminuir la cantidad de WAKIX que entra en la sangre. Es posible que sea necesario ajustar la dosis de WAKIX si está tomando estos medicamentos.

Wakix[®]
pitolisant tablets

¿Qué hace la histamina en el cerebro?

La histamina es una sustancia química natural del cerebro que funciona de dos maneras para ayudarnos a permanecer despiertos durante el día

Histamina:



Aumenta la actividad cerebral en áreas que le ayudan a despertarse

Disminuye la actividad cerebral en las zonas que le ayudan a dormir, incluidas las zonas que paralizan los músculos mientras duerme

Wakix[®]
pitolisant tablets



Vea un breve video en [WAKIX.com](https://www.wakix.com)

WAKIX® (pitolisant) redujo significativamente la SDE en comparación con el placebo

WAKIX se estudió para el tratamiento de la **somnolencia diurna excesiva (SDE)** en **dos ensayos clínicos** en **159 adultos con narcolepsia**.

- WAKIX se comparó con placebo (píldora de azúcar) usando un cuestionario llamado Escala de somnolencia de Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS). La ESS mide el nivel de SDE preguntándole qué probabilidad hay de que se adormezca o se duerma en 8 situaciones cotidianas.
- En los ensayos, 97 pacientes recibieron tratamiento con WAKIX y 62 pacientes recibieron placebo.

Al inicio de los ensayos, la mayoría de los pacientes notificaron SDE grave

Sus puntuaciones en la ESS fueron de 16 o más, lo que significa que tuvieron una **alta probabilidad de adormecerse o dormirse en situaciones cotidianas**, como:



Leer



Ver la televisión



Sentarse y hablar

El ensayo 1 y el ensayo 2 fueron los ensayos clínicos para la SDE.

- El ensayo 1 duró 8 semanas e incluyó a 61 adultos con narcolepsia con o sin cataplejía (31 pacientes fueron tratados con WAKIX y 30 recibieron placebo). Alrededor del 80 % de los pacientes en el ensayo tuvieron cataplejía y alrededor del 20 % no.
- El ensayo 2 también duró 8 semanas e incluyó a 98 adultos con narcolepsia con o sin cataplejía (66 pacientes fueron tratados con WAKIX y 32 recibieron placebo). En este ensayo, el 75 % de los pacientes desarrolló cataplejía y el 25 % no.

Wakix[®]
pitolisant tablets



Al final de los ensayos...



Las puntuaciones de la ESS mejoraron significativamente en los pacientes que tomaron WAKIX en comparación con placebo

Esto significa que los pacientes que tomaron WAKIX notificaron una **puntuación de ESS significativamente menor o una menor probabilidad de somnolencia o sueño en las situaciones cotidianas** en comparación con el placebo.

- Cada persona responde a la medicación de forma diferente. Las respuestas individuales variaron en los ensayos clínicos.



Escuche la historia de Kristen en [WAKIX.com](https://www.wakix.com)



Kristen

Vive con narcolepsia
Toma WAKIX desde 2020

Significativamente menos ataques de cataplejía con WAKIX® (pitolisant) en comparación con placebo

WAKIX se estudió para el tratamiento de la **cataplejía** en **dos ensayos clínicos** en **154 adultos con narcolepsia**.

- WAKIX se comparó con placebo (píldora de azúcar) midiendo con qué frecuencia los pacientes de los ensayos experimentaron **cataplejía**. La cataplejía se definió como **debilidad muscular repentina, a menudo provocada por emociones**.
- **Un ensayo** midió el número de **crisis de cataplejía semanales** y **el otro ensayo** midió la cantidad de **crisis de cataplejía diarias**.
- En los ensayos, 79 pacientes recibieron tratamiento con WAKIX y 75 pacientes recibieron placebo.

Al inicio del ensayo, en el que se midieron semanalmente las crisis de cataplejía, de media, los pacientes desarrollaron unas 8 crisis de cataplejía por semana

Algunos ejemplos de cataplejía son:



Deformación de rodillas



Debilidad de las manos

(caída de objetos)



Mandíbula colgante

Los ensayos 3 y 1 fueron los ensayos clínicos de cataplejía.

- El ensayo 3 duró 7 semanas e incluyó a 105 adultos con narcolepsia con cataplejía (54 pacientes fueron tratados con WAKIX y 51 recibieron placebo). Este ensayo midió el número de crisis semanales de cataplejía.
- El ensayo 1 duró 8 semanas e incluyó a 49 adultos con narcolepsia con cataplejía (25 pacientes fueron tratados con WAKIX y 24 recibieron placebo). Este ensayo midió la cantidad de crisis diarias de cataplejía.

Wakix[®]
pitolisant tablets



Al final de este ensayo...



Los pacientes que tomaron WAKIX tuvieron aproximadamente la mitad de crisis de cataplejía por semana en comparación con los pacientes que tomaron placebo

- Cada persona responde a la medicación de forma diferente. Las respuestas individuales variaron en los ensayos clínicos.



Escuche la historia de Chris en [WAKIX.com](https://www.wakix.com)



Chris

Vive con narcolepsia
Toma WAKIX desde 2021



Indicaciones y uso

WAKIX es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE) o la aparición repentina de músculos débiles o paralizados (cataplejía) en adultos con narcolepsia.

Información importante de seguridad

No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier componente de WAKIX, o si tiene enfermedad hepática grave.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus condiciones médicas, incluido si tiene irregularidades en el ritmo cardíaco, si nació con una condición cardíaca o si los niveles de electrolitos en la sangre son demasiado altos o demasiado bajos. WAKIX tiene un efecto sobre la actividad eléctrica del corazón conocida como prolongación del intervalo QT. Los medicamentos con este efecto pueden provocar alteraciones en el ritmo cardíaco, que son más probables en pacientes con factores de riesgo como determinadas afecciones cardíacas, o cuando se toman en combinación con otros medicamentos que afectan al QT. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los demás medicamentos que tome.

El riesgo de prolongación del intervalo QT puede ser mayor en pacientes con enfermedad hepática o renal. WAKIX no está recomendado en pacientes con enfermedad renal terminal.

Los efectos secundarios más frecuentes observados con WAKIX fueron insomnio, náuseas y ansiedad. Otros efectos secundarios fueron dolor de cabeza, infección de las vías respiratorias superiores, dolor osteomuscular, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución del apetito. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de WAKIX. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le preocupe o que no desaparezca.

Información importante de seguridad (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta. Algunos medicamentos pueden aumentar la cantidad de WAKIX® (pitolisant) que entra en la sangre y algunos medicamentos pueden disminuir la cantidad de WAKIX que entra en la sangre. Es posible que sea necesario ajustar la dosis de WAKIX si está tomando estos medicamentos.

WAKIX también puede disminuir la eficacia de algunos medicamentos, incluidos los métodos anticonceptivos hormonales. Debe usar un método anticonceptivo no hormonal alternativo durante el tratamiento con WAKIX y durante al menos 21 días después de la interrupción del tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o si tiene previsto quedar embarazada.

Existe un récord de exposición durante el embarazo que supervisa los desenlaces de los embarazos en mujeres expuestas a WAKIX durante el embarazo. Se le recomienda inscribirse en el récord de embarazos de WAKIX si queda embarazada mientras toma WAKIX. Para inscribirse u obtener información del récord, llame al 1-800-833-7460.

No se ha establecido la seguridad y efectividad de WAKIX en pacientes menores de 18 años.

Le recomendamos que notifique a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088. También puede notificar efectos secundarios negativos a Harmony Biosciences llamando al 1-800-833-7460.



Más información sobre WAKIX en
WAKIX.com

Wakix[®]
pitolisant tablets

¿Qué efectos secundarios se observaron en los ensayos clínicos?

En los ensayos clínicos de adultos con narcolepsia, los efectos secundarios más frecuentes de **WAKIX® (pitolisant)** y al menos el doble de la tasa de placebo (píldora de azúcar) fueron:



Insomnio



Náuseas



Ansiedad

Efectos secundarios que se produjeron en al menos el 5 % de los pacientes tratados con WAKIX y con más frecuencia que con placebo

	WAKIX (n = 152)	Placebo (n = 114)
Dolor de cabeza	18 %	15 %
Insomnio	6 %	2 %
Náuseas	6 %	3 %
Infección de las vías respiratorias superiores	5 %	3 %
Dolor musculoesquelético	5 %	3 %
Ansiedad	5 %	1 %

n indica la cantidad de pacientes que fueron tratados con WAKIX o que recibieron placebo.

Wakix[®]
pitolisant tablets

Información adicional sobre los efectos secundarios



Otros efectos secundarios de **WAKIX® (pitolisant)** en los ensayos clínicos incluyeron aumento de la frecuencia cardiaca, alucinaciones, irritabilidad, dolor abdominal, trastornos del sueño y disminución del apetito.



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de WAKIX. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le preocupe o que no desaparezca.

En los ensayos clínicos, algunos pacientes interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios. En estos ensayos:

3.9%

de los pacientes tratados con **WAKIX** interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios

similar a

3.5%

de los pacientes que recibieron **placebo** interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios

Wakix
pitolisant tablets

¿Cómo debo tomar WAKIX® (pitolisant)?



Las tabletas de WAKIX deben tomarse una vez al día por la mañana, tan pronto como se despierte

Solo necesita tomar WAKIX una vez al día por la mañana. Evite tomar WAKIX más tarde ese día.

- Si omite una dosis, tome la siguiente dosis a la mañana siguiente tan pronto como se despierte.

La presentación de WAKIX es de dos tabletas (4.45 mg y 17.8 mg). Dependiendo de la dosis, es posible que tenga que tomar más de una tableta. **Tome siempre WAKIX exactamente como se lo haya prescrito su proveedor de atención médica.**

TOME WAKIX

- ✓ Por la mañana, tan pronto como se despierte
- ✓ Una vez al día
- ✓ Todos los días

NO TOME WAKIX

- ✗ Más tarde ese día
- ✗ Más de una vez al día
- ✗ Solo en determinados días

Si tiene alguna pregunta sobre cuándo tomar WAKIX, hable con su proveedor de atención médica.

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta. Algunos medicamentos pueden aumentar la cantidad de WAKIX que entra en la sangre y algunos medicamentos pueden disminuir la cantidad de WAKIX que entra en la sangre. Es posible que sea necesario ajustar la dosis de WAKIX si está tomando estos medicamentos.



¿Cómo empezaré con WAKIX® (pitolisant)?



Su proveedor de atención médica trabajará con usted para encontrar la dosis adecuada para usted

Su proveedor de atención médica comenzará con una dosis más baja y aumentará su dosis cada semana para encontrar la dosis adecuada para usted. Este proceso se llama **ajuste posológico**.

- El ajuste posológico puede llevar tiempo, pero es importante que usted y su proveedor de atención médica encuentren la dosis adecuada para usted.

Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo se siente después de comenzar con WAKIX.

- Infórmele de cualquier **mejoría** que note, así como de **cualquier posible efecto secundario**.



No deje de tomar ni cambie la dosis por su cuenta sin hablar primero con su proveedor de atención médica. Si tiene alguna pregunta, hable con su proveedor de atención médica.

“Mi médico y yo tuvimos una comunicación abierta sobre todo mientras nos enfocábamos en encontrar la dosis correcta para mí”.

~ Kristen

Wakix[®]
pitolisant tablets

¿Puedo tomar antihistamínicos si estoy tomando WAKIX[®] (pitolisant)?



Se deben evitar algunos tipos de antihistamínicos con WAKIX

Ciertos antihistamínicos pueden impedir que la histamina funcione en el cerebro. Estos medicamentos pueden reducir la efectividad de WAKIX y deben evitarse.



Pregunte a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que puede tomar con WAKIX

Su proveedor de atención médica puede hacerle sugerencias sobre qué antihistamínicos o tratamientos alternativos puede tomar con WAKIX y qué antihistamínicos debe evitar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta.



¿Qué más debo saber sobre WAKIX® (pitolisant)?



No hay interacciones farmacológicas significativas con el oxicato de sodio o el modafinilo

En un estudio clínico en el que se tomó WAKIX con oxicato de sodio o modafinilo, **no hubo efectos significativos** en los niveles de los medicamentos en el cuerpo.

- Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar.



Puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales

WAKIX puede reducir la eficacia de **los anticonceptivos hormonales (métodos anticonceptivos)**.

- Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo no hormonal alternativo mientras estén tomando WAKIX y durante al menos 21 días después de la interrupción del tratamiento.



No es una sustancia controlada

WAKIX es el único tratamiento aprobado por la FDA para personas con narcolepsia que **no es una sustancia controlada**.

- Una sustancia controlada es un fármaco o producto químico regulado por el gobierno en función de su potencial de abuso y dependencia.
- En un estudio clínico, WAKIX no mostró potencial de abuso, similar al placebo (píldora de azúcar).

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o si tiene previsto quedar embarazada.

Existe un récord de exposición durante el embarazo que supervisa los desenlaces de los embarazos en mujeres expuestas a WAKIX durante el embarazo. Se le recomienda inscribirse en el récord de embarazos de WAKIX si queda embarazada mientras toma WAKIX. Para inscribirse u obtener información del récord, llame al 1-800-833-7460.



¿Qué debo esperar cuando tomo WAKIX® (pitolisant)?

Al comenzar a tomar un medicamento, especialmente para un trastorno crónico como la narcolepsia, es importante que hable con su proveedor de atención médica para que pueda ayudarle a entender qué esperar del tratamiento.

A continuación, le indicamos algunas cosas de las que debe hablar con su proveedor de atención médica sobre qué esperar con WAKIX:



WAKIX no es un estimulante

La forma en que se siente su cuerpo al tomar WAKIX puede ser diferente de los medicamentos que ha tomado en el pasado.



Es importante dar tiempo a WAKIX para que funcione

Cada persona responde a la medicación de forma diferente. Es importante saber que WAKIX puede tardar algún tiempo en funcionar y, para algunas personas, **puede tardar hasta 8 semanas** en lograr una respuesta.



Hable de su progreso con su proveedor de atención médica

Hable sobre cómo se siente después de comenzar a tomar WAKIX:

- Infórmele de cualquier **mejoría** que note, así como de **cualquier posible efecto secundario**.
- **No deje de tomar ni cambie la dosis por su cuenta** sin hablar primero con su proveedor de atención médica.
- Su médico puede ajustarle la dosis de WAKIX para encontrar una dosis adecuada para usted.





Las respuestas individuales a WAKIX pueden variar.

“Unas semanas después de aumentar la dosis hasta llegar a la correcta, noté cambios graduales en mi desvelo general y una disminución de mi somnolencia”.

Kristen

Vive con narcolepsia
Toma WAKIX desde 2020

Wakix[®]
pitolisant tablets




Escuche la historia de Kristen y otras historias personales en [WAKIX.com](https://www.wakix.com)

Escuche lo que la gente real tiene que decir acerca de WAKIX



Observe a personas reales que viven con narcolepsia mientras comparten sus experiencias con la condición y cómo les ha ayudado WAKIX



Escuche más historias personales en [WAKIX.com](https://www.wakix.com)

Busque grupos de apoyo y obtenga más información

Hay varios grupos y organizaciones que pueden proporcionar información, apoyo y más para las personas que viven con narcolepsia y sus seres queridos.



www.narcolepsynetwork.org



www.project-sleep.com



Wake Up Narcolepsy
INC.

www.wakeupnarcolepsy.org



Obtenga más información sobre cómo encontrar apoyo en la comunidad de la narcolepsia



El programa de apoyo **WAKIX for You** está aquí para ayudarle

Una vez que su profesional de atención médica le prescriba **WAKIX® (pitolisant)**, usted tiene la opción de inscribirse en **WAKIX for You**, un programa que proporciona apoyo financiero y reembolso individual basado en sus necesidades específicas y en la elegibilidad.



Trabaja con su plan de seguro para determinar la cobertura



Ofrece programas de apoyo financiero para pacientes elegibles



Se asegura de que su receta se envíe a la farmacia especializada para que puedan organizar la entrega directamente a usted



Proporciona recursos educativos

Wakix
for You[™]

Póngase en contacto con
WAKIX for You



1-855-WAKIX4U

(1-855-925-4948)

De lunes a viernes,
de 8 A. M. A 8 P. M. hora del este

\$0

Puede ser elegible para pagar tan solo un copago de \$0 en su receta de WAKIX con el programa **WAKIX for You**.*

*Esta oferta es válida solo para pacientes que tengan un seguro comercial (no financiado por el gobierno). Se aplican términos y condiciones adicionales.



WAKIX es una marca comercial registrada y WAKIX for You es una marca comercial de Bioprojet Europe, Ltd.
El nombre y el logotipo de Harmony Biosciences son marcas comerciales registradas.
© 2023 Harmony Biosciences. Todos los derechos reservados.
US-WAK-2300050/abr 2023

Wakix
pitolisant tablets